

TD 3 bis. Equation de la chaleur

Exercice 1. On note g_t le noyau de la chaleur, défini par :

$$\forall t > 0, x \in \mathbb{R}^d, g_t(x) := \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}$$

Pour une donnée initiale $f \in C_b^0(\mathbb{R}^d)$, on pose $u(x, t) := (f \star g_t)(x)$.
Montrer que u est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^d \times]0, +\infty[$ et vérifie

$$\forall t > 0, x \in \mathbb{R}^d, \partial_t u(x, t) = \Delta u(x, t)$$

d'une part, et d'autre part

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, u(x, t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} f(x)$$

Exercice 2. Avec les notations précédentes, pour $f \in C_b^0(\mathbb{R}^d)$ et $t > 0$, on définit

$$S_t f : \begin{cases} \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (f \star g_t)(x) \end{cases}$$

et on pose $S_0 f = f$.

Montrer que :

1. si $f \geq 0$ alors $S_t f \geq 0$ pour tout $t \geq 0$
2. pour $s, t \geq 0$, $S_{t+s} = S_t \circ S_s$ (propriété de semi-groupe).

Exercice 3. On garde toujours les notations précédentes et on fixe $f \in C^1(\mathbb{R}^d)$ telle que f et ∇f soient bornées, précisément $\|\nabla f\|_\infty \leq L$ pour une constante $L > 0$.

1. On fixe $t \geq 0$ et $x \in \mathbb{R}^d$ et on définit

$$\forall s \in [0, t], \phi(s) := S_s (e^{S_{t-s} f})(x)$$

Montrer que

$$\forall s \in]0, t[, \phi'(s) = S_t (|\nabla F|^2 e^F)$$

où $F(x, s) := S_{t-s} f(x)$.

En déduire que

$$S_t(e^f)(x) \leq e^{S_t f(x) + L^2 t}$$

2. On note γ la mesure gaussienne standard sur \mathbb{R}^d . Montrer que

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^f d\gamma \leq e^{\int_{\mathbb{R}^d} f d\gamma + \frac{L^2}{2}}$$

3. Montrer qu'on a égalité si $f(x) = a \cdot x$ avec $|a| = L$.
4. Montrer que pour toute fonction $f \in C^1(\mathbb{R}^d)$ 1-lipschitzienne, on a

$$\forall r > 0, \gamma \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid f(x) \geq r + \int_{\mathbb{R}^d} f d\gamma \right\} \leq e^{-\frac{r^2}{2}}$$

Exercice 4. On va montrer l'inégalité de Hölder en utilisant l'équation de la chaleur : pour $\theta \in [0, 1]$ et f, g mesurables positives :

$$(L) : \int_{\mathbb{R}^d} f(x)^\theta g(x)^{1-\theta} dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx \right)^\theta \left(\int_{\mathbb{R}^d} g(x) dx \right)^{1-\theta}$$

$$(G) : \int_{\mathbb{R}^d} f(x)^\theta g(x)^{1-\theta} d\gamma(x) \leq \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x) d\gamma(x) \right)^\theta \left(\int_{\mathbb{R}^d} g(x) d\gamma(x) \right)^{1-\theta}$$

On se place ici dans le cas $f, g \in C_b^0 \cap L^1$ pour limiter les calculs.

1. Soit $t \geq 0$ et $x \in \mathbb{R}^d$ fixés, pour $0 \leq s \leq t$ on pose

$$\phi(s) := S_s \left[(S_{t-s}f)^\theta (S_{t-s}g)^{1-\theta} \right] (x)$$

et

$$F := \ln S_{t-s}f, \quad G := \ln S_{t-s}g, \quad K := \theta F + (1-\theta)G$$

de sorte que $\phi(s) = S_s(e^K)(x)$.

Montrer que

$$\phi'(s) = S_s \left[e^K (|\nabla K|^2 - \theta|\nabla F|^2 - (1-\theta)|\nabla G|^2) \right] (x) \leq 0$$

2. En déduire (G).
3. En déduire (L).

Exercice 5. On considère cette fois l'équation de Schrödinger

$$(S) : i\partial_t u = \Delta u \quad \text{sur} \quad \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+$$

On fixe une donnée initiale $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, montrer l'existence et l'unicité d'une fonction $u \in C^0([0, +\infty[; \mathcal{S}(\mathbb{R}^d))$ telle que

1. u est C^2 sur $\mathbb{R}^d \times]0, +\infty[$
2. u vérifie (S) sur $\mathbb{R}^d \times]0, +\infty[$
3. $u(x, 0) = f(x)$ sur \mathbb{R}^d

Montrer que cette solution u est donnée par la formule

$$\forall t \geq 0, x \in \mathbb{R}^d, u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{i(|\xi|^2 t + i\xi \cdot x)} d\xi$$